




TAHOR[®] 80_{mg} atorvastatine

comprimé pelliculé

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. QU'EST-CE QUE TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE TAHOR 80 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un hypocholestérolémiant qui abaisse la quantité de cholestérol dans votre sang. Il est habituellement prescrit lorsque les activités physiques, la perte de poids et les modifications de votre régime alimentaire n'ont pas permis d'abaisser suffisamment ce taux de cholestérol.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines hypercholestérolémies, lorsqu'un régime adapté et assidu s'est avéré insuffisant.

Ce médicament est également préconisé dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales en addition ou non à d'autres traitements.

Il est également indiqué en :

- Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec 3 facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée.
- Prévention des événements coronaires et cérébrovasculaires chez des patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque, avec ou sans hyperlipidémie associée.

La poursuite du régime est toujours indispensable.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TAHOR 80 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie connue à l'un des composants (voir « Que contient TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé ? »),
- Affection hépatique en cours d'évolution, augmentation prolongée des enzymes du foie,
- En cas d'association à l'itraconazole, kétoconazole (*médicaments traitants certaines infections à champignons*), au stiripentol (*traitement de l'épilepsie*), à la télichromycine, à la delavirdine (*traitement d'une infection par le VIH*),
- Chez la femme qui allaite (voir Grossesse – allaitement).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ETRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin, en cas d'association à un autre médicament prescrit pour le cholestérol, un fibrate (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Faites attention avec TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé :

- Dans le traitement des hypercholestérolémies, le respect scrupuleux du régime alimentaire prescrit par le médecin est indispensable.
- Un bilan hépatique sera effectué avant traitement et régulièrement sous traitement.
- Si vous présentez l'un des symptômes suivants: douleur musculaire, crampe ou faiblesse musculaire, en particulier si elles s'accompagnent de malaise ou de fièvre: arrêtez de prendre TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin immédiatement (cf. rubrique Effets non souhaités et gênants).
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION dans les cas suivants :

- Si vous consommez d'importantes quantités d'alcool ou si vous avez eu une maladie hépatique ;
- Si vous avez des problèmes rénaux, une insuffisance en hormones thyroïdiennes, un antécédent personnel ou familial de la maladie musculaire, si vous avez eu des problèmes musculaires lors d'un traitement précédent abaissant le taux de cholestérol (par exemple une autre «statine» ou un «fibrate»). Dans tous ces cas, votre médecin peut avoir besoin d'effectuer des analyses de sang avant et pendant votre traitement par TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé ;
- Si vous êtes âgé de plus de 70 ans ;
- La consommation du jus de pamplemousse doit être évitée.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Il est particulièrement important que votre médecin sache si vous prenez un fibrate (un autre médicament qui baisse le cholestérol sanguin) ou si vous êtes traité pour une infection due à un champignon ou au VIH.

Grossesse

Ce médicament n'a pas d'indication pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

En cas de désir de grossesse ou si vous souhaitez allaiter votre enfant, prévenez votre médecin.

Allaitement


L'atorvastatine passant dans le lait maternel, ce traitement ne doit pas être utilisé si vous allaitez.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : lactose

448 714





3. COMMENT PRENDRE TAHOR 80 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Posologie

La posologie est de 1 comprimé par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Mode d'administration

Voie orale.

A prendre en une seule fois (indifféremment avant, pendant ou après le repas).

En association avec le régime, ce médicament constitue un traitement devant être très prolongé et régulièrement surveillé.

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière, qui comporte des contrôles sanguins réguliers du cholestérol. Les enzymes du foie (transaminases) seront aussi surveillées régulièrement.

Si vous avez pris plus de TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû: consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé: il convient de poursuivre l'administration du produit à la dose prévue.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Fréquents (plus d'un patient sur 100): insomnie, céphalées, vertiges, diminution de la sensibilité cutanée, sensation de picotement, de fourmillements, nausées, douleurs abdominales, digestion difficile, diarrhées, constipation, flatulences, éruption ou démangeaison au niveau de la peau, douleur musculaire, du dos ou des articulations, fatigue, douleurs au niveau du thorax;
- Peu fréquents (entre 1 patient sur 100 et 1 patient sur 1000): diminution du nombre de plaquettes dans le sang (thrombocytopénie), perte d'appétit, augmentation ou diminution du taux de sucre dans le sang, troubles de l'humeur, tremblements, modification du goût, atteinte des nerfs des membres, perte de la mémoire, troubles de la vue, bourdonnements dans les oreilles et/ou la tête, vomissements, perte des cheveux, réaction allergique de type urticaire, impuissance, malaise, prise de poids;
- Rares ou très rares (moins de 1 patient sur 1000): œdème, atteintes du foie (hépatite, jaunisse, augmentation du taux des enzymes du foie) ou du pancréas, réactions cutanées sévères pouvant parfois se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique, éruption bulleuse, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps, tendinopathies (atteinte des tendons) parfois compliquées de rupture de tendons, inflammation des muscles, douleurs ou crampes musculaires intenses qui, très rarement ont évolué vers une rhabdomyolyse (destruction des cellules musculaires).

Si vous ressentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire ou une faiblesse musculaire, contactez immédiatement votre médecin car les problèmes musculaires peuvent être graves dans de rares cas.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TAHOR 80 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption figurant sur la boîte.

Il n'y a pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé ?

La substance active est:

Atorvastatine	80,00 mg
Sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée	86,76 mg
Pour un comprimé pelliculé	

Les autres composants sont:

Carbonate de calcium, cellulose microcristalline, lactose monohydraté, croscarmellose sodique, polysorbate 80, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium.

Pelliculage : hypromellose, macrogol 8000, dioxyde de titane, talc.

Emulsion anti-mousse : siméthicone, stéarates émulsifiants, acide sorbique, eau.

Qu'est ce que TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîtes de 28, 30, 50, 90 ou 100.

Titulaire

PFIZER HOLDING FRANCE
23-25, Av. du Dr. Lannelongue
75014 PARIS

Fabricant

GODECKE
79090 FREIBOURG
ALLEMAGNE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19/11/09.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

