

Haute Autorité de santé
COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

AVIS

2 février 2005

CAMPTO 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion (IV)

CAMPTO 40 mg/2 ml, solution à diluer pour perfusion (IV)

Laboratoires PFIZER

Motif de la demande : Saisine de la Direction Générale de la Santé.

Direction de l'évaluation des actes et des produits de santé

SERVICE MEDICAL RENDU

Les cancers sont des affections fréquentes, habituellement graves qui engagent le pronostic vital.

Ces spécialités entrent dans le cadre de traitement curatif, palliatif ou adjuvant.

Leur efficacité est établie. Ces spécialités sont essentielles à la prise en charge de ces pathologies.

Ces spécialités sont en général utilisées dans le cadre de protocoles de poly-chimiothérapie ou en association à la chirurgie ou à la radiothérapie.

Ces spécialités sont des médicaments de première ou de deuxième intention en fonction du type de cancer.

Le choix des spécialités antinéoplasiques et leur place dans la stratégie thérapeutique est fonction des caractéristiques du cancer (type, nature localisation de la tumeur, atteinte ou non d'autres organes, etc.) et de celles du patient (âge, état général, réponse au traitement...).

Les effets indésirables des anticancéreux dépendent de leur classe thérapeutique et sont liés à leur toxicité sur les cellules normales et incluent :

Myélosuppression

Nausées et vomissements

Atteinte des muqueuses digestives (mucites, stomatites...)

Les troubles cardiaques (anthracyclines)

Néphrotoxicité (mitocine et sels de platine)

Alopécie

Stérilité

Le service médical rendu par ces spécialités dans l'ensemble de leurs indications est important.