



AROMASINE®

25 mg exemestane

Comprimé enrobé

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé

La substance active est:

Exemestane: 25 mg pour un comprimé.

Les autres composants sont :

Noyau du comprimé: silice colloïdale hydratée, crospovidone, hypromellose, stéarate de magnésium, mannitol, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique (type A), polysorbate 80.

Enrobage: hypromellose, alcool polyvinylique, siméticone, macrogol 6000, saccharose, carbonate de magnésium léger, dioxyde de titane, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), cire d'esters cétyliques, talc, cire de carnauba.

Encre d'impression: alcool éthylique, gomme-laque, oxydes de fer noir (E172), oxyde de titane (E171).

TITULAIRE

Pfizer Holding France

23-25, Av. du Dr. Lannelongue
75014 PARIS

Tél. : 01 58 07 34 40

FABRICANT

Pfizer Italia S.r.l.
ASCOLI PICENO - Italie

1. QU'EST-CE QUE AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Comprimé enrobé, boîte de 30.

ANTI-HORMONES-INHIBITEURS ENZYMATIQUES

AROMASINE est utilisé dans le traitement de certaines maladies du sein chez la femme ménopausée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé ?

Ne pas prendre AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie connue à l'exemestane ou à l'un des autres composants,
- avant la ménopause,
- en cas de grossesse ou d'allaitement,
- en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption glucose/galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Les comprimés d'Aromasine contiennent du parahydroxybenzoate de méthyle qui peut être à l'origine de réactions allergiques (réactions retardées possibles).

Prendre des précautions particulières avec AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé et consultez votre médecin si un traitement hormonal substitutif vous a déjà été prescrit ou si vous avez une maladie des reins ou du foie.

Les femmes atteintes ou à risque d'ostéoporose devront avoir une évaluation de la densité minérale osseuse avant de débiter le traitement par Aromasine. Une surveillance étroite devra être réalisée.

Grossesse

La prise d'AROMASINE est contre-indiquée en cas de grossesse.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

4201765.04.1

Allaitement

La prise d'AROMASINE est contre-indiquée en cas d'allaitement.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est déconseillé de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez faible, somnolente ou prise de vertige pendant votre traitement avec AROMASINE.

Excipients à effet notoire : saccharose, parahydroxybenzoate de méthyle.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

VEUILLEZ INDIQUER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RÉCEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, MÊME S'IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

3. COMMENT PRENDRE AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé ?

Posologie

Dans tous les cas se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 25 mg par jour.

AROMASINE n'est pas recommandé chez l'enfant.

Si vous avez l'impression que l'effet d'AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Le comprimé est à avaler avec un peu d'eau, de préférence après un repas et tous les jours à la même heure.

Durée du traitement

La durée du traitement est déterminée par votre médecin.

Si vous avez pris plus d'AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé que vous n'auriez dû :

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Si vous oubliez de prendre AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé :

Prenez-le aussitôt que vous vous en apercevez à moins qu'il soit temps de prendre le comprimé suivant, mais ne prenez pas plus d'une dose à la fois.

NE PRENEZ PAS DE DOSE DOUBLE POUR COMPENSER LA DOSE SIMPLE QUE VOUS AVEZ OUBLIÉE DE PRENDRE.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- les effets indésirables les plus fréquents sont : insomnies, maux de tête, bouffées de chaleur, nausées, transpiration excessive, douleurs articulaires, fatigue, augmentation légère des enzymes hépatiques.
 - les autres effets indésirables fréquents sont : perte de l'appétit, dépression, douleurs (y compris douleur à l'abdomen), vomissements, constipation, digestion difficile, diarrhée, éruptions cutanées, perte des cheveux, œdèmes périphériques, vertiges, fourmillements et engourdissements de la main.
 - les effets indésirables peu fréquents sont : somnolence, asthénie.
- Lors des analyses biologiques, il est à noter que certains paramètres biologiques peuvent être modifiés notamment ceux liés à la fonction hépatique (foie) et le nombre de lymphocytes (une certaine catégorie de globules blancs circulant dans le sang) et des plaquettes.

SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDÉSIRABLES NON MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

5. COMMENT CONSERVER AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ne prenez pas AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé si vous constatez des signes visibles de détérioration.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est décembre 2005.

4201765.04.1

