

Pivalone®

Pivalate de tixocortol
SUSPENSION NASALE 1%

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Pivalate de tixocortol.....1,000 g
Excipients : alcool benzylique, chlorure de sodium, phosphate monosodique dihydraté, soluté officinal d'hydroxyde de sodium, eau purifiée q.s.p.....100 g
Conservateur : chlorure de N-cétylpyridinium

FORME PHARMACEUTIQUE

Suspension nasale, flacon de 10 ml (100 pulvérisations environ par flacon).

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

CORTICÓIDE POUR USAGE NASAL (R : système respiratoire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les manifestations inflammatoires et allergiques du rhinopharynx : rhinites allergiques, rhinites saisonnières, rhinites congestives aiguës et chroniques, rhinites vaso-motrices.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas :

- d'antécédents allergiques à l'un des composants du produit.
- d'épistaxis (saignements du nez).
- d'existence en cours de traitement d'infections virales ou fongiques, de surinfection locale importante.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

A utiliser après mouchage ou nettoyage soigneux du nez.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

VOIE NASALE. NE PAS AVALER.

Mode d'administration : voir au dos.

Durée du traitement

La durée d'administration sera la plus courte possible (quelques jours).

SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :
Des réactions d'intolérance locale (picotements...) peuvent survenir en début de traitement.

De rares réactions locales, soit à type de sécheresse de la muqueuse nasale, soit de type allergique (manifestations locales cutanées, œdème (infiltration de liquides dans les tissus) superficiel du visage et/ou des muqueuses et exceptionnellement laryngées) ont été signalées. Elles cèdent à l'arrêt du traitement. En cas de survenue de telles manifestations, consultez votre médecin.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AU VERSO

17708
5R9902


CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.


DATE DE REVISION DE LA NOTICE :

MAI 1997


MODE D'EMPLOI



- 1 - Agiter énergiquement**
le flacon de bas en haut avant
chaque utilisation.
Oter le capuchon de protection.



- 2 - Amorcer la pulvérisation**
par 4 à 5 pressions successives
avant la première utilisation
et éventuellement au cours du
traitement.



- 3 - Introduire l'embout verticalement**
dans la narine et presser à fond.
Remettre le capuchon
de protection après chaque utilisation.

Attention
Respecter ces différentes étapes
Ne jamais chercher à modifier l'orifice de pulvérisation.



Titulaire:
Pfizer Holding France
23-25, Av. du Dr. Lannelongue - 75014 Paris - Tél : 01 58 07 34 40
Fabricant : FARMEA - 49000 Angers



17708
5R9902