

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

Direction des Etudes Médico-Economiques
et de l'Information Scientifique

Service médical rendu par la spécialité

Avis de la Commission

13 décembre 2000

SYNAREL 200 µg, solution endonasale
Flacon pulvérisateur de 10 ml

nafaréline

Laboratoire MONSANTO FRANCE SA

Indication (s) :

Endométriose à localisation génitale et extragénitale (du stade I au stade IV).

L'expérience clinique relative au traitement de l'endométriose est limitée aux femmes âgées de 18 ans et plus.

La durée du traitement est limitée à 6 mois (cf Effets indésirables).

Il n'est pas souhaitable d'entreprendre une seconde cure par la nafaréline ou par un autre analogue de la GnRH.

INDICATION :

Endométriose à localisation génitale et extra-génitale (du stade I au stade IV).

L'expérience clinique relative au traitement de l'endométriose est limitée aux femmes âgées de 18 ans et plus.

La durée du traitement est limitée à 6 mois (cf Effets indésirables).

Il n'est pas souhaitable d'entreprendre une seconde cure par la nafaréline ou par un autre analogue de la GnRH.

Caractère habituel de gravité de l'affection traitée :

L'affection concernée par cette spécialité se caractérise par une évolution vers un handicap et/ou une dégradation marquée de la qualité de vie

Efficacité/Sécurité d'emploi de la spécialité :

Cette spécialité entre dans le cadre d'un traitement curatif

Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est modeste

Place dans la stratégie thérapeutique :

Cette spécialité est un médicament de recours

Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette spécialité

Intérêt en termes de santé publique :

Sans objet pour l'attribution du service médical rendu

Conclusion de la Commission de la Transparence

Niveau de service médical rendu pour cette spécialité : faible