

mieux comprendre...

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'informations. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr>. Pour plus d'informations, consulter la rubrique «Déclarer un effet indésirable» sur le site internet de l'ANSM: <http://ansm.sante.fr>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

INLYTA® (axitinib) dans le cancer du rein avancé



Document s'inscrivant dans le cadre
d'un plan de gestion des risques

INLYTA® (axitinib) est indiqué
dans le traitement du cancer
du rein avancé après échec
d'un traitement antérieur par
sunitinib ou cytokine.





otre médecin spécialiste vient de vous prescrire INLYTA® pour traiter votre maladie. Il vous en a certainement exposé les bénéfices et les éventuelles contraintes. Pendant toute la durée de votre traitement, lui et son équipe vont vous suivre et vous accompagner.

Ce carnet de suivi vient en complément de la notice qu'il est important de consulter avant de débiter votre traitement et a pour vocation de :

- **mieux comprendre votre traitement** par INLYTA®
- vous informer au mieux sur **les aspects pratiques de votre traitement** et vous permettre de **participer activement à votre traitement, notamment en notant les symptômes observés au cours de votre traitement.**
- **faciliter le lien entre les équipes hospitalières, le médecin traitant et la famille.**

→ **Il est indispensable que vous puissiez faire part à votre médecin au plus tôt des symptômes éventuellement observés pendant votre traitement. Ces informations seront précieuses afin qu'il puisse mieux vous prendre en charge, et adapter votre traitement si nécessaire.**



sommaire

1. Mes contacts & numéros importants	5
2. Mes rendez-vous	6
3. INLYTA®	10
Comment ça marche ?	
Comment se déroule le traitement ?	
Comment prendre le traitement ?	
Quelles précautions prendre ?	
Quelle surveillance pendant le traitement ?	
4. Conduite à tenir face aux effets indésirables	14
5. Suivi de votre traitement	25
6. Associations de Patients	54
7. Notice patient	55

Mes contacts & numéros importants

PERSONNEL

- Nom :
 - Prénom :
 - Adresse :
.....
 - Téléphone :
-

MÉDECIN SPÉCIALISTE RÉFÉRENT :

- Tél :

INFIRMIÈRE :

- Tél :

MÉDECIN TRAITANT :

- Tél :

PSYCHOLOGUE :

- Tél :

UROLOGUE :

- Tél :

DIÉTÉTICIENNE :

- Tél :

PHARMACIEN :

- Tél :

MÉDECIN RADIOTHÉRAPEUTE :

- Tél :

NUMÉROS À CONTACTER EN CAS D'URGENCE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mes prochains rendez-vous

→ Notez ici les dates de vos consultations, de vos examens à effectuer.

Date	Heure	Rendez-vous

→ Vous pouvez noter toutes les questions que vous souhaitez poser à votre médecin lors d'un prochain rendez-vous :

→ Notez ici les dates de vos consultations, de vos examens à effectuer.

Date	Heure	Rendez-vous

→ Vous pouvez noter toutes les questions que vous souhaitez poser à votre médecin lors d'un prochain rendez-vous :

mes prochains rendez-vous

→ Notez ici les dates de vos consultations, de vos examens à effectuer.

Date	Heure	Rendez-vous

→ Vous pouvez noter toutes les questions que vous souhaitez poser à votre médecin lors d'un prochain rendez-vous :

→ Notez ici les dates de vos consultations, de vos examens à effectuer.

Date	Heure	Rendez-vous

→ Vous pouvez noter toutes les questions que vous souhaitez poser à votre médecin lors d'un prochain rendez-vous :

Qu'est-ce que c'est ?

INLYTA® est un traitement anti-cancéreux qui s'administre par voie orale et dont l'action consiste à bloquer des récepteurs (VEGFR) intervenant dans la formation de nouveaux vaisseaux nécessaires au développement de la tumeur, ce que l'on appelle l'« **angiogénèse** ».

En bloquant de façon puissante le VEGFR, il va empêcher la formation de nouveaux vaisseaux nécessaire au développement de la tumeur, entraînant par conséquence une « asphyxie » de la tumeur.

- INLYTA® a obtenu une autorisation de mise sur le marché le 3 septembre 2012. Il est indiqué dans **le traitement du cancer du rein avancé après échec d'un traitement antérieur par sunitinib ou cytokine.**

Ce traitement est disponible sur **prescription médicale hospitalière et vous sera exclusivement prescrit par un médecin ayant l'expérience du traitement des cancers.**

Une surveillance particulière est nécessaire au cours du traitement.

Si votre médecin vous a prescrit ce traitement c'est qu'il pense qu'il est le plus approprié pour prendre en charge votre maladie.

Comment se déroule le traitement sous INLYTA® ?

INLYTA® est un traitement par **voie orale** qui se prend **2 fois par jour (matin et soir), à 12h d'intervalle.**



Comment prendre le traitement ?

La posologie initiale est un comprimé de 5 mg d'INLYTA® matin et soir.

Ce traitement peut être pris **avec ou sans nourriture avec un grand verre d'eau de préférence à heure fixe.**

Cependant la dose administrée pourra être modifiée tout au long de votre traitement. En effet, votre médecin spécialiste pourra décider d'augmenter ou de diminuer temporairement ou définitivement la dose de votre traitement, notamment si vous présentez des effets secondaires ou en présence de certains traitements associés.

Ainsi la posologie de votre traitement pourra varier dans le temps.

			
Augmentation de dose	10 mg 2 fois par jour		
	7 mg 2 fois par jour		
Dose d'initiation	5 mg 2 fois par jour		
Diminution de dose	3 mg 2 fois par jour		
	2 mg 2 fois par jour		

Pour ce faire, il existe **4 dosages d'INLYTA® (7 mg, 5 mg, 3 mg, et 1 mg)**, tous conditionnés dans des boîtes de 56 comprimés.

- Ne pas couper les comprimés
- En cas de vomissements ou de prise d'INLYTA® oubliée, celle-ci ne doit pas être compensée le lendemain : prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant.
- Pour éviter tout risque d'erreur, les comprimés ne doivent pas être déconditionnés et stockés dans un pilulier
- Assurez-vous que votre boîte d'INLYTA® reste hors de la vue et de la portée des enfants.

Quelles précautions prendre ?

Certains médicaments peuvent interagir avec INLYTA®, il est important que vous informiez votre médecin et/ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux en vente libre, ou des produits à base de plante (par exemple: millepertuis ou jus de pamplemousse...).

D'un point de vue alimentaire, **le pamplemousse peut interagir avec les enzymes qui métabolisent INLYTA®.**

Ne prenez pas INLYTA® si vous êtes allergique à l'axitinib, substance active d'INLYTA® ou à l'un de ses excipients.



Quelle surveillance pendant le traitement ?


Votre médecin spécialiste référent vous prescrira les **examens nécessaires avant instauration et au cours du traitement par INLYTA®.**

La surveillance de votre traitement pourra comprendre les examens suivants :

- Une évaluation régulière de votre tension artérielle tout au long de votre traitement et particulièrement les 15 premiers jours de votre traitement ou à chaque modification de dose.
- Une surveillance de la fonction thyroïdienne
- Une prise de sang
- Une bandelette urinaire
- Un contrôle de la fonction hépatique
- Les signes et symptômes d'insuffisance cardiaque doivent être surveillés régulièrement pendant le traitement (fatigue excessive, gonflement de l'abdomen, des jambes ou des chevilles, essoufflement, veines du cou saillantes).

D'autres examens pourront être réalisés en fonction de vos symptômes ou si votre médecin le juge nécessaire.

Les résultats de ces examens ainsi que les éléments que vous aurez portés à la connaissance de l'équipe médicale pourront, si votre médecin le juge utile, entraîner une adaptation du traitement.



À RETENIR

- Suivre attentivement les conseils et recommandations de votre médecin spécialiste référent sur la prise de votre traitement.
- Garder votre traitement hors de la vue et de la portée des enfants.
- Respecter la posologie prescrite par votre médecin.
- Ne pas couper les comprimés, ni les sortir du blister.
- Prendre votre traitement à heure fixe dans la mesure du possible, avec un grand verre d'eau.
- Vous pouvez prendre votre traitement à n'importe quel moment de la journée, pendant ou en dehors des repas.
- En cas de vomissements ou d'oubli de dose un jour, celle-ci ne doit pas être compensée à la prise suivante ou le jour suivant.
- Informer votre médecin de tout traitement, vitamines, plantes médicinales que vous prenez de façon régulière ou ponctuelle. Certains de ces traitements peuvent interagir avec INLYTA®.
- Communiquer à votre médecin toute apparition d'effets indésirables.

Conduite à tenir face aux effets indésirables

Comme avec tout médicament, **INLYTA®** peut occasionner des effets indésirables ou des effets non souhaités.

Les effets indésirables **connus et les plus fréquemment rapportés** sous INLYTA® (chez plus de 20% des patients) sont :

- **Diarrhée**
- **Hypertension**
- **Fatigue**
- **Diminution de l'appétit**
- **Nausées**
- **Diminution du poids**
- **Dysphonie (modification de la voix-enrouement)**
- **Syndrome main-pied**
- **Hémorragie**
- **Hypothyroïdie**
- **Vomissement**
- **Protéinurie**
- **Toux**
- **Constipation**

Des effets indésirables peuvent apparaître dès le début du traitement. D'un patient à l'autre, certains effets pourront se révéler plus sévères que d'autres.

- **N'hésitez pas à noter tous les symptômes et les signes que vous observez sous traitement dans ce livret. Certains effets indésirables peuvent nécessiter l'intervention de votre médecin et/ou l'instauration d'un traitement rapide.**
- **Il est important que vous communiquiez, dès que possible, à votre médecin toute apparition, modification ou aggravation de ces effets indésirables.**
- **Les conduites à tenir face aux effets indésirables sont principalement issues de recommandations de l'INCa (Les traitements du cancer du rein, collection Guides patients Cancer info, INCa, mars 2013) et du Programme National Nutrition et Santé.**

LES PRINCIPAUX SIGNES D'ALERTE NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE PAR VOTRE MÉDECIN SPÉCIALISTE

→ INLYTA® peut être à l'origine d'effets indésirables sérieux.
Votre médecin spécialiste doit en être informé très rapidement
afin de pouvoir adapter votre traitement

→ Les signes devant vous conduire à appeler votre médecin
spécialiste :

- Maux de tête, sensation de vertige, palpitations, bourdonnements d'oreille
- Essoufflement de manière continue ou en présence d'une douleur thoracique inhabituelle
- Signes de déshydratation liés à une diarrhée associée ou non à des vomissements
- Fièvre > 38°C, sueur, frissons
- Signes d'anomalie de la fonction thyroïdienne se traduisant par une fatigue apparaissant plus facilement, une sensation de froid plus importante que les autres personnes ou une voix devenant plus grave
- Signes d'insuffisance cardiaque (fatigue extrême, gonflement de l'abdomen, des jambes ou des chevilles, essoufflement, ou veines du cou saillantes)
- Toux, notamment si vous crachez du sang
- Maux de ventre intenses
- Hémorragies (selles noires, toux ou crachat avec présence de sang)
- Troubles de la vision, confusion, convulsions
- Si vous avez un anévrisme (élargissement et affaiblissement de la paroi d'un vaisseau sanguin)

Diarrhée

Le traitement par INLYTA® peut dans certains cas induire des diarrhées qui sont définies par l'émission de plus de trois selles de consistance très molle à liquide par jour.

- Ne tardez pas à prévenir votre médecin généraliste ou votre médecin spécialiste référent.
- Un traitement médical bien conduit vous soulagera efficacement.
- Vous devez impérativement boire 2 litres d'eau par jour car une diarrhée prolongée provoque une perte d'eau et de sels.
- Une diarrhée non prise en charge peut induire une déshydratation pouvant diminuer vos capacités musculaires, aggraver votre fatigue et altérer le fonctionnement de vos reins.

CONSEILS PRATIQUES



- Buvez 2 litres d'eau par jour mais en petite quantité : eau, thé, tisane, eau de riz, bouillon de légumes, jus de carottes
- Privilégiez une alimentation pauvre en fibres : riz, pâtes, pommes de terre, ...
- Évitez le café, les fruits, les légumes crus, les laitages, les aliments gras et épicés, les céréales et le pain complet.

Hypertension

C'est un effet indésirable très fréquent sous INLYTA®.

En effet INLYTA® peut induire une hypertension artérielle ou déstabiliser une hypertension artérielle déjà bien contrôlée.

Cet effet peut survenir dès le 1^{er} jour de traitement.

Il sera important de mesurer votre tension artérielle quotidiennement pendant les 15 premiers jours de traitement puis régulièrement comme vous l'aura conseillé votre médecin et de noter les chiffres de votre tension artérielle sur votre carnet de suivi.

Pour mesurer sa tension dans les meilleures conditions, il faut être **au calme et en position assise pendant 3 à 5 minutes** **Pendant les 30 minutes avant la mesure, ne faites pas d'exercice physique, ne fumez pas, évitez de manger et ne consommez pas de caféine. Ne parlez pas pendant la prise des mesures et entre les prises.**

En présence de **maux de tête, de sensation de vertige, de palpitations, de bourdonnements d'oreille il est impératif que vous contactiez votre médecin spécialiste afin qu'il puisse mesurer et diagnostiquer une hypertension artérielle puis instaurer un traitement anti-hypertenseur et adapter, voire interrompre temporairement votre traitement par INLYTA®.**

CONSEILS PRATIQUES

- Mesurez votre tension régulièrement comme vous l'aura conseillé votre médecin
- Ayez une bonne hygiène de vie
- Faites de l'exercice, contrôlez votre poids, buvez de l'alcool avec modération, limitez la consommation de sel (< 2 g/jour).

Fatigue

C'est un effet indésirable très fréquent sous INLYTA®.

Cette fatigue peut se traduire par un **affaiblissement ou une sensation de fatigue générale**. Dans certains cas exceptionnels, elle peut vous obliger à rester alité, c'est pourquoi il est important au moindre signe de fatigue d'en parler à votre médecin afin d'en rechercher les causes.

Cette fatigue disparaîtra le plus souvent quelques jours après l'interruption du traitement.

→ En cas de fatigue persistante, informer votre médecin. D'autres facteurs comme une carence en vitamines ou folates, une diminution des globules rouges, une dépression ou un trouble de la fonction thyroïdienne peuvent également générer de la fatigue. Votre médecin vous prescrira des examens complémentaires pour en détecter la cause et si nécessaire ajustera votre traitement par INLYTA®.

CONSEILS PRATIQUES

- Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement et correctement)
- Donnez la priorité aux activités qui vous font plaisir
- Faites un peu d'exercice : marche, vélo...
- Prévoyez des moments de repos au cours de la journée
- Relaxe vous autant que possible : musique, lecture...
- Déléguiez certaines tâches (cuisine, ménage, course...)



Dysphonie (modification de la voix - enrrouement)

C'est un effet indésirable très fréquent sous INLYTA®.

La dysphonie est une **modification de la voix** pouvant se traduire par un **enrouement, une voix éraillée ou soufflée**.

En cas de dysphonie persistante, informer votre médecin qui pourra vous référer à un ORL ou adapter votre traitement

CONSEILS PRATIQUES

→ Buvez de l'eau et sucez des pastilles pour limiter les effets liés à la dysphonie



Nausées et vomissements

Ce sont des effets indésirables très fréquents.

- **Informez votre médecin généraliste ou spécialiste, ces manifestations sont modérées et facilement gérées dans la majorité des cas par des traitements anti-nauséeux ou antiémétiques simples.**

→ Des nausées ou vomissements pendant plus de 48 heures doivent vous conduire à revoir votre médecin.

CONSEILS PRATIQUES

- Privilégiez les aliments froids ou tièdes qui sont moins odorants que les aliments chauds
- Évitez les aliments frits, gras ou épicés
- Privilégiez plusieurs petits repas dans la journée afin de faciliter la digestion
- Évitez de boire pendant les repas. Les boissons fraîches à base de cola peuvent parfois diminuer la sensation de nausée
- Supprimez le tabac
- En cas de vomissements, rincez-vous la bouche avec de l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger.



La diminution de l'appétit et la perte de poids

La diminution de l'appétit et la perte de poids sont des effets indésirables très fréquents sous INLYTA®.

→ Les conseils avisés d'une diététicienne peuvent vous aider à retrouver un équilibre alimentaire. Votre médecin peut vous prescrire des suppléments caloriques qui aideront à traverser cette période au cours de votre traitement.

CONSEILS PRATIQUES

- Mangez en petite quantité et quand vous avez faim
- Buvez moins au cours de votre repas
- Essayez de nouveaux aliments
- Faites un peu d'exercice qui favorisera l'appétit
- Suivez régulièrement votre poids



Syndrome main-pied

Le traitement par INLYTA® peut entraîner des modifications de la peau pouvant se traduire plus fréquemment par une sécheresse cutanée ou parfois par des éruptions cutanées type boutons, plaques rouges.

Les sécheresses cutanées concernent dans un premier temps les extrémités et peuvent s'accompagner de fissures au niveau des doigts. Des **rougeurs** puis une **sensibilité douloureuse** et une **desquamation de la peau** peuvent apparaître au niveau de la **paume des mains et la plante des pieds**.

CONSEILS PRATIQUES

Pour limiter les troubles cutanés, de façon générale :

- Utilisez des savons doux sans parfums
- Utilisez une crème hydratante qui vous permettra de prévenir cette sécheresse et de vous soulager efficacement.
- Evitez les vêtements serrés et les frottements vestimentaires
- Informez votre médecin dès l'apparition des premières lésions cutanées

Pour limiter le syndrome main-pied :

- Réalisez des soins de manucure et de pédicure avant et pendant le traitement
- Portez des chaussures confortables pour éviter les zones de pression
- Evitez l'exposition des mains et des pieds à la chaleur (soleil, bains chauds)
- Evitez la marche prolongée et la course à pied



Constipation

La constipation est un effet indésirable très fréquent sous INLYTA®.

En cas de troubles du transit, ne tardez pas à prévenir votre médecin généraliste ou votre médecin spécialiste référent.

CONSEILS PRATIQUES

Pour limiter la constipation :

- Buvez au moins 2 litres d'eau par jour
- Privilégiez les aliments riches en fibres comme les fruits et les légumes frais, les compotes de pruneaux
- Consommez des céréales et du pain complet
- Faites de l'exercice de façon régulière
- Buvez un verre d'eau glacée ou un jus de fruits (hormis jus de pamplemousses) au réveil.

Problème de saignement

Votre traitement INLYTA® peut entraîner des problèmes de saignements. Ceux-ci surviennent lorsque le sang ne parvient plus à coaguler normalement. Cela peut entraîner un saignement prolongé ou excessif.

Si vous présentez un gonflement ou un saignement pendant votre traitement, ou si vous présentez des saignements de nez accompagnés d'essoufflement et de maux de tête, contactez immédiatement votre médecin.

Il existe un risque de formation d'anévrismes et/ou de dissections artérielles associé à la prise du traitement INLYTA®. Si on vous a diagnostiqué un anévrisme avant d'initier le traitement par INLYTA®, ou si vous souffrez d'hypertension, informez votre médecin qui prendra en compte ces facteurs de risque.

CONSEILS PRATIQUES

En cas de saignement de nez ponctuel :

- Restez calme
- Penchez légèrement la tête en avant ou en arrière selon votre confort
- Pressez la narine d'où provient le saignement durant 15 minutes environ, jusqu'à l'arrêt complet du saignement.



Suivi de votre traitement

Votre médecin vient de vous prescrire INLYTA® pour traiter votre maladie. Il vous en a exposé les bénéfices et les éventuelles contraintes.

Afin d'optimiser au mieux le suivi de votre traitement, il est indispensable que vous puissiez faire part à votre médecin des effets indésirables éventuellement observés pendant votre traitement. En effet ces informations seront précieuses pour votre médecin afin qu'il puisse mieux vous prendre en charge, voire adapter votre traitement si nécessaire.

Nous vous rappelons qu'il est également important d'informer votre médecin et/ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux en vente libre, ou des produits à base de plante (cf rubrique « Quelles précautions prendre ? » p.12 de ce document).

Dans ce livret vous pourrez reporter les éléments pratiques de votre traitement, les examens réalisés et les effets indésirables que vous présentez.

RAPPEL

→ **Il est important que vous rapportiez à votre médecin tous les effets indésirables que vous ressentez au cours de votre traitement ainsi que toute apparition, modification ou augmentation de ces effets.**

Suivi de ma tension artérielle

Il est conseillé de prendre **quotidiennement votre tension artérielle lors des 15 premiers jours de traitement** ou lorsqu’une modification de dose survient au cours du traitement. Par la suite la tension artérielle pourra être **suivie régulièrement selon les conseils de votre médecin**.

Pour rappel: Votre tension doit être prise assise, au calme et après 3 à 5 minutes de repos. Pendant les 30 minutes avant la mesure, ne faites pas d'exercice physique, ne fumez pas, évitez de manger et ne consommez pas de caféine. Ne parlez pas pendant la prise des mesures et entre les prises.

Date	Noter votre posologie ou changement de posologie	Prise / non prise du traitement	Tension artérielle Matin (à 3 minutes d'intervalle)			Tension artérielle Soir (à 3 minutes d'intervalle)		
			1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise	1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						
		Matin ☐ Soir ☐						

Date	Noter votre posologie ou changement de posologie	Prise / non prise du traitement	Tension artérielle Matin (à 3 minutes d'intervalle)			Tension artérielle Soir (à 3 minutes d'intervalle)		
			1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise	1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						

Date	Noter votre posologie ou changement de posologie	Prise / non prise du traitement	Tension artérielle Matin (à 3 minutes d'intervalle)			Tension artérielle Soir (à 3 minutes d'intervalle)		
			1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise	1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						

Date	Noter votre posologie ou changement de posologie	Prise / non prise du traitement	Tension artérielle Matin (à 3 minutes d'intervalle)			Tension artérielle Soir (à 3 minutes d'intervalle)		
			1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise	1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						

Date	Noter votre posologie ou changement de posologie	Prise / non prise du traitement	Tension artérielle Matin (à 3 minutes d'intervalle)			Tension artérielle Soir (à 3 minutes d'intervalle)		
			1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise	1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						

Date	Noter votre posologie ou changement de posologie	Prise / non prise du traitement	Tension artérielle Matin (à 3 minutes d'intervalle)			Tension artérielle Soir (à 3 minutes d'intervalle)		
			1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise	1 ^{ère} prise	2 ^{ème} prise	3 ^{ème} prise
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						
		Matin ☐						
		Soir ☐						

CYCLE 1

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en 1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles

: absence de symptômes

: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 2

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en 1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles



: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 3

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en
1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles



: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 4

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en 1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles

: absence de symptômes

: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 5

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en
1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles



: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 6

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en
1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles



: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 7

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en
1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles



: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 8

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en
1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles



: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 9

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en
1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles



: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?

CYCLE 10

1 cycle = 28 jours de traitement

Prenez votre/vos comprimé(s) en
1 prise le matin et 1 prise le soir

Date de début :

Date de fin :

Posologie :

→ Si vous présentez des symptômes suite à l'administration de votre traitement par INLYTA®, notez les dans le tableau ci-dessous :

	Intensité*	Commentaires / Date d'apparition
Maux de tête		
Vertige		
Palpitations		
Bourdonnements d'oreille		
Fatigue		
Diarrhée		
Nausées/vomissements		
Diminution de l'appétit		
Sécheresse cutanée		
Dysphonie (enrouement)		
Perte de poids		

* Pour indiquer l'intensité de vos symptômes, positionnez une croix entre les 2 sigles




: absence de symptômes



: symptômes très intenses

→ Prenez-vous un nouveau traitement en plus de vos traitements
habituels et d'INLYTA® ? Si oui, le(s)quel(s) ?



A large, rounded rectangular area with a thin orange border, containing 25 horizontal orange lines for writing.

Associations de Patients

ADRESSES UTILES

→ ARTuR (Association pour la Recherche des Tumeurs du Rein)

Association A.R.T.u.R
9, Rue Nicolas Charlet
75015 Paris
Mail : asso-artur@artur-rein.org
Site internet : www.artur-rein.org

→ LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER (FÉDÉRATION NATIONALE)

14, rue corvisart – 75013 PARIS
Téléphone : 01 53 55 24 00
Site internet : www.ligue-cancer.net

→ CANCER INFO SERVICE

Service de la Ligue Nationale contre le Cancer, du Ministère de la Santé,
de l'Institut National du Cancer et du Plan Cancer.
Téléphone : 0 805 123 124

→ INSTITUT NATIONAL DU CANCER

Agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie chargée
de coordonner les actions de lutte contre le cancer.
Site internet : <http://www.e-cancer.fr/>

Pour une information complète sur INLYTA[®], suivez ce lien :

<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>
ou scannez le code ci-dessous.



