

**Conservez toujours cette carte sur vous et montrez-la aux professionnels de santé qui participent à vos soins médicaux (par exemple, votre pharmacien ou un médecin urgentiste).**

**Qu'est-ce que Cibinqo et dans quel cas est-il utilisé ?**

CIBINQO est un médicament à base d'abrocitinib. Il appartient à la famille des inhibiteurs de Janus kinase, qui aident à réduire l'inflammation. Il agit en réduisant l'activité d'une enzyme dans le corps appelée « Janus kinase », qui est impliquée dans l'inflammation.

CIBINQO est utilisé pour traiter les adultes et les adolescents de 12 ans et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère, également connue sous le nom d'eczéma atopique.

**Votre nom :**

**Nom de votre médecin (qui a prescrit CIBINQO) :**

**Numéro de téléphone du médecin :**

**La date à laquelle vous avez commencé votre traitement :**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé [www.signalement.social-sante.gouv.fr](http://www.signalement.social-sante.gouv.fr)

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.



PP-CIB-FRA-0202 - Mai 2024 - Pfizer, société par actions simplifiée au capital de 47 570 €. Siège social : 23-25 avenue du Dr Lannelongue 75014 Paris. 433 623 550 RCS Paris.  
Locataire-gérant de Pfizer Holding France.  
TVA Intra : 73 433 623 550.



**CIBINQO▼ (abrocitinib)  
CARTE PATIENT**

**Informations importantes de sécurité.**

- Cette carte contient des informations de sécurité et décrit les signes et symptômes que vous devez connaître afin d'avertir votre médecin sans délai si ils apparaissent au cours du traitement par CIBINQO.
- Avant de prendre CIBINQO, lisez attentivement la notice d'information incluse dans la boîte ou consultable sur la base de données publique des médicaments, <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>.
- Si certaines informations ne sont pas claires, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

CIBINQO peut augmenter le risque d'infections, le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de thrombose veineuse et le risque de cancer.

Il est **important** que votre médecin ait connaissance des informations suivantes vous concernant :

- Vous avez 65 ans ou plus,
- Vous êtes diabétique,
- Vous avez des antécédents de maladies cardio-vasculaires (par exemple, infarctus du myocarde, hypertension, accident vasculaire cérébral),
- Vous avez déjà eu des caillots sanguins dans les veines de vos jambes (phlébite) ou de vos poumons (embolie pulmonaire),
- Vous avez subi récemment une intervention chirurgicale majeure,
- Vous utilisez des contraceptifs hormonaux ou un traitement hormonal de la ménopause,

- Un défaut de coagulation est identifié chez vous ou chez vos parents proches,
- Vous êtes fumeur ou avez longtemps fumé,
- Vous avez (ou avez eu) un cancer,

car ces situations augmentent les risques associés à la prise de CIBINQO.

## Risque d'infections

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des symptômes tels que fièvre, transpiration ou frissons, douleurs musculaires, toux ou essoufflement, sang dans les expectorations, perte de poids, diarrhée ou douleur à l'estomac, brûlure lorsque vous urinez ou envie d'uriner plus fréquente que d'habitude, plaie, sensation de fatigue inhabituelle ou problèmes dentaires, car ils peuvent être des signes d'infection.

Prévenez votre médecin si vous présentez une éruption cutanée douloureuse avec des cloques, car cela peut être un signe de zona ;

## Vaccination

Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant toute vaccination car certains vaccins (les vaccins vivants atténués comme par exemple le ROR ou les vaccins contre la varicelle, la fièvre jaune ou le zona) doivent être évités avant et pendant le traitement par CIBINQO.

## Risque de caillots sanguins dans les veines ou dans les poumons

Alertez **immédiatement** votre médecin, si vous ressentez :

- Un essoufflement soudain ou une difficulté à respirer,
- Une douleur thoracique ou une douleur dans le haut du dos,

- Un gonflement de la jambe ou du bras,
- Une douleur ou une sensibilité à la jambe, ou une rougeur ou une décoloration de la jambe ou du bras, car cela peut être des signes de caillots sanguins dans les veines.

Informez votre médecin si vous devez subir une intervention chirurgicale majeure.

## Risque de maladie cardiaque

Alertez **immédiatement** votre médecin, si vous développez :

- Une douleur ou oppression thoracique sévère (pouvant se propager aux bras, à la mâchoire, au cou et au dos),
- Des essoufflement, sueurs froides,
- Des étourdissements ou vertiges soudains,

car ils peuvent être des signes d'une crise cardiaque.

## Risque de cancer

CIBINQO peut notamment augmenter le risque de cancers cutanés. Des cancers de la peau non-mélanomateux ont été observés chez les patients prenant Cibiinqo. Votre médecin peut vous recommander d'effectuer des examens réguliers de la peau durant votre traitement par CIBINQO. Si vous observez une nouvelle excroissance cutanée ou si une lésion pré-existante change d'aspect, parlez-en à votre médecin.

## Analyses biologiques

Votre médecin vous demandera de faire des analyses biologiques (dépistage de la tuberculose et de l'hépatite virale, formule sanguine, dosage des lipides dans le sang pour dépister une éventuelle hypercholestérolémie) avant et aussi pendant le traitement par CIBINQO. Il pourra ajuster votre traitement et son suivi en conséquence.

## Contraception et grossesse

**CIBINQO ne doit PAS être utilisé pendant la grossesse.**

Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et pendant au moins un mois après la dernière prise de CIBINQO (l'utilisation de contraceptifs hormonaux combinés est un facteur de risque d'évènements thromboemboliques veineux).

Parlez à votre médecin des méthodes de contraceptions les plus appropriées.

Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte ou pensez avoir pu tomber enceinte pendant le traitement.